

Imatinova

Imatinib 100 y 400 mg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas: 175 X 400 mm
Color: Negro
Material: Papel Celulosa 57 gr.

Sentido de la fibra: Indistinto.
Doblado: en 4 horizontal medida final doblado 25 x 175mm

IMATINOVA

IMATINIB 100 MG - IMATINIB 400 MG

Comprimidos recubiertos

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Puede contribuir comunicando los efectos adversos que pudiera usted tener. La parte final de la sección 4 incluye información sobre cómo comunicar estos efectos adversos.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Contenido del prospecto

1. Qué es Imatinova y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Imatinova
3. Cómo tomar Imatinova
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Imatinova
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Imatinova y para qué se utiliza

Imatinova es un medicamento que contiene un principio activo denominado imatinib. Este medicamento actúa inhibiendo el crecimiento de las células anormales en las enfermedades que se describen a continuación. Estas incluyen algunos tipos de cáncer.

Imatinova es un tratamiento para adultos y niños para:

- **Leucemia mieloide crónica (LMC).** La leucemia es un cáncer de las células blancas de la sangre. Estas células blancas normalmente ayudan al cuerpo a combatir infecciones. La leucemia mieloide crónica es una forma de leucemia en la que unas células blancas anormales (llamadas células mieloides) empiezan a crecer sin control.
- **Leucemia linfoblástica aguda cromosoma Filadelfia positivo (LLA Ph-positivo).** La leucemia es un cáncer de las células blancas de la sangre. Estas células blancas normalmente ayudan al cuerpo a combatir infecciones. La leucemia linfoblástica aguda es una forma de leucemia en que unas células blancas anormales (llamadas linfoblastos) empiezan a crecer sin control. Imatinova inhibe el crecimiento de estas células.

Imatinova también es un tratamiento para adultos para:

- **Síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos (SMD/SMP).** Estos son un grupo de enfermedades de la sangre en que algunas células de la sangre empiezan a crecer sin control. Imatinova inhibe el crecimiento de estas células en un cierto subtipo de estas enfermedades.
- **Síndrome hipereosinofílico (SHE) y/o leucemia eosinofílica crónica (LEC).** Estas son enfermedades de la sangre en las que unas células de la sangre (llamadas eosinófilos) empiezan a crecer sin control. Imatinova inhibe el crecimiento de estas células en un cierto subtipo de estas enfermedades.
- **Tumores del estroma gastrointestinal (GIST).** GIST es un cáncer del estómago e intestino. Se origina por un crecimiento celular incontrolado de los tejidos de soporte de estos órganos.
- **Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP).** El DFSP es un cáncer del tejido que está debajo de la piel en que algunas células empiezan a crecer sin control. Imatinova inhibe el crecimiento de estas células.

En el resto de este prospecto se utilizan estas abreviaturas al referirse a estas enfermedades.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo actúa Imatinova o por qué este medicamento se le ha recetado a usted, pregunte a su médico.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Imatinova

Sólo lo recetará Imatinova un médico con experiencia en medicamentos para tratar el cáncer de células sanguíneas o los tumores sólidos. Siga cuidadosamente todas las instrucciones de su médico, aunque éstas sean diferentes de la información general contenida en este prospecto.

No tome Imatinova:

- si es alérgico al imatinib o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si este caso le aplica a usted, informe a su médico y no tome Imatinova.

Si usted cree que puede ser alérgico, pero no está seguro, pida consejo a su médico.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar Imatinova:

- Si tiene o ha tenido algún problema de hígado, riñón o corazón.
- si está tomando un medicamento que contiene levotiroxina porque le han extirpado la glándula tiroidea.
- si alguna vez ha tenido o podría tener en este momento una infección por el virus de la hepatitis B. Esto se debe a que Imatinova podría hacer que la hepatitis B se volviera activa de nuevo, lo que puede resultar mortal en algunos casos. El médico deberá comprobar atentamente si hay signos de esta infección antes de comenzar el tratamiento. Si mientras está tomando Imatinova le aparecieran moratones, sangrados, fiebre, fatiga y confusión, por favor contacte a su médico. Esto podría ser una señal de daño de los vasos sanguíneos llamada microangiopatía trombótica (MAT).
- Si alguno de estos casos es aplicable a usted, **informe a su médico antes de tomar Imatinova.**

Durante el tratamiento con Imatinova, informe a su médico inmediatamente si aumenta de peso muy rápidamente. Imatinova puede causar retención de agua en el cuerpo (retención de líquidos grave).

Mientras esté tomando Imatinova, su médico le controlará regularmente si el medicamento está actuando. También se le realizarán análisis de sangre y será pesado regularmente.

Niños y adolescentes

Imatinova es también un tratamiento para niños con LMC. No hay experiencia en niños con LMC menores de 2 años de edad. La experiencia en niños con LLA Ph-positivo es limitada y la experiencia en niños con SMD/SMP, DFSP, GIST y SHE/LEC es muy limitada.

Algunos niños y adolescentes que toman Imatinova pueden tener un crecimiento más lento de lo normal. El médico controlará el crecimiento en visitas periódicas.

Uso de Imatinova con otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta (como paracetamol) e incluso los medicamentos a base de plantas medicinales (como Hierba de San Juan). Algunos medicamentos pueden interferir con el efecto de Imatinova cuando se administran conjuntamente. Estos pueden aumentar o disminuir el efecto de Imatinova, conduciendo a un aumento de los efectos adversos o haciendo que Imatinova sea menos efectivo. Imatinova puede producir el mismo efecto a otros medicamentos.

Informe a su médico si está utilizando medicamentos que previenen la formación de coágulos en la sangre.

Embarazo, lactancia y fertilidad

- Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.
- No está recomendado el uso de Imatinova durante el embarazo excepto si fuese claramente necesario, ya que puede causar un daño a su bebé. Su médico comentará con usted los posibles riesgos de tomar Imatinova durante el embarazo.
- Se recomienda a las mujeres que pudieran quedarse embarazadas que utilicen un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento.
- No dé el pecho a su bebé durante el tratamiento con Imatinova.
- Los pacientes que estén preocupados sobre su fertilidad mientras estén tomando Imatinova deberán consultarlo con su médico.

Conducción y uso de máquinas

Puede sufrir mareos o somnolencia o visión borrosa mientras está tomando este medicamento. Si los sufre, no conduzca ni maneje herramientas o máquinas hasta que se sienta bien de nuevo.

3. Cómo tomar Imatinova

Su médico le ha prescrito Imatinova porque sufre una enfermedad grave. Imatinova puede ayudarle a combatir esta enfermedad.

Sin embargo, siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. Es importante que lo haga durante el tiempo que se lo indique su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

No deje de tomar Imatinova a menos que se lo indique su médico. Si no puede tomar el medicamento como le ha recetado su médico o piensa que no necesita tomarlo durante más tiempo, contacte con su médico inmediatamente.

Qué cantidad tomar de Imatinova

Uso en adultos

Su médico le indicará exactamente cuántos comprimidos de Imatinova debe tomar.

- **Si usted está siendo tratado de LMC:** Dependiendo de su situación, la dosis inicial normal es de 400 mg o 600 mg.
- **400 mg,** es decir 8 comprimidos **una vez al día.**
- **600 mg,** es decir 12 comprimidos **una vez al día.**
- **Si usted está siendo tratado de GIST:**

La dosis inicial es 400 mg, es decir 8 comprimidos **una vez al día.**

Para LMC y GIST, su médico puede prescribirle una dosis superior o inferior dependiendo de cómo responda al tratamiento. Si su dosis diaria es de 800 mg (16 comprimidos), debe tomar 8 comprimidos por la mañana y 8 comprimidos por la noche.

- **Si está siendo tratado de LLA Ph-positivo:** La dosis inicial es de 600 mg, es decir 12 comprimidos una vez al día.
- **Si está siendo tratado de SMD/SMP:** La dosis inicial es de 400 mg, es decir 8 comprimidos una vez al día.
- **Si está siendo tratado de SHE/LEC:** La dosis inicial es de 100 mg, es decir 2 comprimidos una vez al día. Su médico puede decidir aumentar la dosis a 400 mg, es decir, 8 comprimidos una vez al día, dependiendo de cómo responda a su tratamiento.
- **Si está siendo tratado de DFSP:** La dosis es de 800 mg al día (16 comprimidos), es decir, 8 comprimidos por la mañana y 8 comprimidos por la noche.

Uso en niños y adolescentes
El médico le indicará cuántos comprimidos de Imatinova debe administrar al niño. La cantidad de Imatinova administrada dependerá de la situación del niño, peso corporal y altura. La dosis total diaria en niños no debe superar los 800 mg en LMC y 600 mg en LLA Ph+. El tratamiento puede darse al niño una vez al día o, alternativamente, la dosis puede repartirse en dos tomas (la mitad por la mañana y la mitad por la noche).

Cuándo y cómo tomar Imatinova

- **Tome Imatinova con alimentos.** Esto ayudará a protegerle de problemas en su estómago al tomar Imatinova.
- **Trague los comprimidos con un gran vaso de agua.** No abra ni triture los comprimidos a menos que tenga dificultad para tragarlos (por ejemplo, en niños).
- Si es incapaz de tragar los comprimidos, puede abrirlas y verter el polvo en un vaso de agua o zumo de manzana.
- Si Vd. es una mujer embarazada o que puede quedar embarazada y trata de abrir los comprimidos, deberá manejar el contenido con precaución con el fin de evitar el contacto con la piel y los ojos o la inhalación. Deberá lavarse las manos inmediatamente después de abrir los comprimidos.

Durante cuánto tiempo tomar Imatinova

Continúe tomando Imatinova cada día durante el tiempo que su médico le diga.

Si toma más Imatinova del que debe

Si accidentalmente ha tomado demasiados comprimidos, hable con su médico inmediatamente. Puede requerir atención médica. Lleve el envase del medicamento.

Si olvidó tomar Imatinova

- Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Sin embargo si ya casi es el momento de la próxima dosis, no tome la que se olvidó.
- En ningún caso continúe con la pauta normal.
- No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

PRP-IMA400-03

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Estos son normalmente de leves a moderados.

Algunos efectos adversos pueden ser graves. Informe a su médico inmediatamente si sufre alguno de los siguientes:

Muy frecuentes (pueden afectar más de 1 de cada 10 pacientes) o **frecuentes** (puede afectar hasta 1 de cada 10 pacientes):

- **Rápido aumento de peso.** Imatinova puede provocar que su cuerpo retenga agua (retención grave de líquidos).
- **Signos de infección tales como fiebre, escalofríos severos, dolor de garganta o úlceras en la boca.** Imatinova puede reducir el número de células blancas de la sangre, por tanto puede sufrir infecciones más fácilmente.
- **Sangrado** o aparición de moratones de forma inesperada (cuando no ha sufrido ninguna herida).

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes) o **raros** (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes):

- **Dolor en el pecho,** ritmo cardíaco irregular (signos de problemas en el corazón).
- **Tos,** con dificultad para respirar o respiración dolorosa (signos de problemas en el pulmón).
- **Sensación de aturdimiento, mareo o desvanecimiento** (signos de tensión arterial baja).
- **Náuseas,** con pérdida de apetito, orina de color oscuro, piel u ojos amarillos (signos de problemas en el hígado).
- **Erupción,** enrojecimiento de la piel, con ampollas en los labios, ojos, piel o boca, descamaciones de la piel, fiebre, manchas de la piel rojas o moradas, picor, sensación de quemazón, erupción con pústulas (signos de problemas en la piel).
- **Dolor abdominal grave,** sangre en su vómito, heces u orina, heces negras (signos de alteraciones gastrointestinales).
- **Desconso importante** en la eliminación de orina, sensación de sed (signos de problemas en el riñón).
- **Náuseas,** con diarrea y vómitos, dolor abdominal o fiebre (signos de problemas intestinales).
- **Dolor de cabeza grave,** debilidad o parálisis en las extremidades o la cara, dificultad para hablar, pérdida repentina de conciencia (signos de problemas en el sistema nervioso como sangrado o hinchazón en el cerebro/cerebro).
- **Fatidez** de la piel, sensación de cansancio y dificultad para respirar, orina de color oscuro (signos de un nivel bajo de glóbulos rojos en la sangre).
- **Dolor en la cadera** o dificultad al caminar.
- **Adormecimiento** o sensación de frío en los pies y dedos (signos del síndrome de Raynaud).
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de una infección de la piel denominada celulitis).
- **Dificultades** de audición.
- **Debilidad muscular** y espasmos musculares, con un ritmo cardíaco anormal (signos de cambios en la cantidad de potasio en la sangre).
- **Mortones.**
- **Dolor de estómago** con náuseas.
- **Espasmos musculares** con fiebre, orina de color rojo-marronoso, dolor o debilidad en los músculos (signos de problemas musculares).
- **Dolor en la pelvis,** algunas veces con náuseas y vómitos, con sangrado vaginal inesperado, sensación de mareo o desvanecimiento debido a la presión sanguínea baja (signos de problemas en los ovarios o el útero).
- **Dolor en los ojos** o trastornos en la visión, sangrado en los ojos.
- **Hinchazón** y enrojecimiento de la piel repentinos (signo de

INSTRUCTIVO DOBLADO

1

ABIRANOVA

ABIRATERONA ACETATO 250 mg

Venta Bajo Receta/Anclivada

Comprimidos

Industria Argentina

Industria Argentina	
Industria Argentina	Industria Argentina
Industria Argentina	Industria Argentina
Industria Argentina	Industria Argentina
Industria Argentina	Industria Argentina

ABIRANOVA (ABIRATERONA ACETATO) es un medicamento antiandrogénico (ABIR) (ABIR)...

Industria Argentina

2

ABIRANOVA

ABIRATERONA ACETATO 250 mg

Venta Bajo Receta/Anclivada

Comprimidos

Industria Argentina

Industria Argentina	
Industria Argentina	Industria Argentina
Industria Argentina	Industria Argentina
Industria Argentina	Industria Argentina
Industria Argentina	Industria Argentina

ABIRANOVA (ABIRATERONA ACETATO) es un medicamento antiandrogénico (ABIR) (ABIR)...

Industria Argentina

3

ABIRANOVA

ABIRATERONA ACETATO 250 mg

Venta Bajo Receta/Anclivada

Comprimidos

Industria Argentina

Industria Argentina	
Industria Argentina	Industria Argentina
Industria Argentina	Industria Argentina
Industria Argentina	Industria Argentina
Industria Argentina	Industria Argentina

ABIRANOVA (ABIRATERONA ACETATO) es un medicamento antiandrogénico (ABIR) (ABIR)...

Industria Argentina

4

ABIRANOVA

ABIRATERONA ACETATO 250 mg